

Mijn bedrijfsmethode

Mijn imkergeschiedenis begint in 1962 in Den Haag. Ik kwam in gesprek met een imker die bezig was een zwerm te scheppen en was direct geïnteresseerd in het bijengebeuren. Hij was toentertijd secretaris van afdeling Den Haag en maakte mij lid van de VBBN subvereniging Den Haag. Van hem mocht ik een jaartje meelopen bij het behandelen van zijn volken om in 1963 met een eigen volk te beginnen. In de loop der jaren heb ik veel methodes geprobeerd met de hulp van Schotman 3de druk; de ene lukte beter dan de andere.

Na het gebruik van Simplex- en Spaarkasten ben ik overgestapt op 12-raams Dadant en Langstroth omdat de Buckfast om meer ruimte vroeg en ik drie broedkamers te gek vond.

Ik gebruik nu voor het tweede jaar een methode die mij best bevalt. Een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje van mijzelf. Ik ga ervan uit dat je een bijenvolk zo weinig mogelijk moet storen en het zoveel mogelijk zelf de keuzes moet laten maken als er om keuzes gevraagd wordt. De bijen lezen de bijenboeken niet maar weten perfect wat het beste voor hen is.

Laten we beginnen eind juli. Dat is de tijd dat ik de zomerhoning oogst. Afhankelijk van het weer kan dat ook een weekje later zijn. De reden is dat ik direct hierna met varroabestrijding begin (die vijf weken duurt) en ik in elk geval half september met alles klaar wil wezen. Ik vermijd dus elk contact tussen honing en bestrijdingsmiddelen. Wel zorg ik ervoor dat er zo snel mogelijk een lege uitgebouwde honingkamer onder de broedkamer komt te staan. Dit wordt ook de winteropstelling. In het najaar kunnen ze lekker uitzakken en in het voorjaar is hij leeg. Tevens haal ik nu het thymolraampje uit de broedkamer en vervang dit door twee strippen Check-Mite+ van Bayer (werkzame stof coumaphos) in de broedkamer te hangen gedurende de komende vijf weken. Dit om de eventueel nog aanwezige varroamijten naar de varroahemel te laten verhuizen.

Naast het hoofdvolk staat een zesramer met één of twee honingkamers erop. Ook deze worden geoogst en ook hier geef ik zo snel mogelijk een uitgebouwde honingkamer terug, zonder rooster ditmaal. Ze mogen in geen geval ook hier geen ruimtegebrek krijgen (deze zesramers zijn uitstekende kunstraaitbouwmachines).

De maand augustus is belangrijk. Vandaar dat ik in

deze maand het weer goed in de gaten houd. Is er een dag geen vliegweer voor de bijen, dan krijgen ze een potje suikeroplossing. De koningin moet aan de gang blijven. De bijen die in augustus en september niet geboren worden kom je in maart/april ook niet tegen. Een aantal jaren geleden waren er in de hele augustusmaand precies drie vliegdagen en hierna kwam in het voorjaar de zogenaamde verdwijnsiekte om de hoek kijken. Drie keer raden wat hier aan de hand is geweest. Niet bij mij dus.

Eind augustus bekijk ik de voedselvoorraad en begin met de wintervoeding. Half september moet dit gereed zijn. Ook de zesramer wordt ingewinterd. Eventueel kan je twee zesramers verenigen in een twaalfraams bak. We zijn klaar voor de winter.

Waarom de zesramer inwinteren?

Mocht er iets fout gaan met een volk, dan dient deze zesramer als reserve. Zoniet, dan kan hij dienen als versterking in het voorjaar.

Situatie nu van de hoofdvolk: bodemplank met wintervlieglat, honingkamer en broedkamer zonder rooster. De zesramer met honingkamer en beide met voldoende voer om de winter door te komen. Half/eind maart (afhankelijk van het weer) haal ik de lege honingkamers onder de broedkamers vandaan en geef een schone bodem. In de zesramer controleer ik of de koningin in de broedkamer zit en leg het rooster. Als er hierna een mooie dag komt maak ik de broedkamers open en haal de overtollige, gevulde voerramen eruit, ook bij de zesramer. De ramen met broed en bijen met koningin van de zesramer worden nu in de broedbak van het hoofdvolk gehangen ter versterking. Tevens hang ik nu een thymolraampje in met 12 gram kristallen. Dit kan zonder gevaar in deze tijd van het jaar. Je zou zelf een keuze kunnen maken welke koningin mee mag de komende tijd – die van het hoofdvolk of die van de zesramer – maar de bijen kunnen dit heel goed zelf bepalen. Tegen de tijd dat er dracht gaat binnenkomen, rooster leggen (niet vergeten) en honingkamer opzetten.

Wat je nu moet doen is kijken wat er binnen komt. Is het weer goed en wordt er goed gehaald of zijn de cellen van de honingkamer gevuld dan een tweede honingkamer ertussen plaatsen.

Wat nu komt is belangrijk!

We kijken naar buiten; de paardebloem bloeit en zodra je de eerste pluizenbollen ziet van de paardebloem,