

varender aan. Daar vindt 'incident-registration' plaats. Met een goede 'follow-up', zodat de kans op een succesvol resultaat aanzienlijk groter is. In Nederland hebben we de Wet op Bestrijdingsmiddelen. De AID heeft de taak om deze te handhaven, maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. Het systeem van projectaanpak komt maar niet van de grond. Te weinig middelen, te weinig afstemming, te weinig motivatie, dat zijn naar onze mening de oorzaken van het falen. Wij doen een klemmend verzoek aan onze landelijke organisaties en aan het Ministerie van Landbouw om

op korte termijn te werken aan een verbetering, zodat getroffen imkers en de gehele natuur niet in de kou blijven staan.

bijen DE LEZER SCHRIJFT

Imkeren met de methode Pfefferle

149

Jan Veldkamp

Jan Veldkamp werkt met de methode 'Pfefferle', hieronder probeert hij aan te geven hoe en wanneer hij van start gaat om zijn volken bijtijds op sterkte te krijgen voor de voorjaarsdracht.

De uitgangssituatie

- De volken zijn ingewinterd op twee broedkamers, waarbij de kantramen zijn vervangen door vulblokken.
- Na het inwinteren beschikken de volken over ca. 20 kg voer.

Omdat de voorjaarsdracht ongeveer half april begint (begin bloei van de kersen), streef ik er naar om op dat moment de derde broedkamer als honingkamer te geven. Dat betekent dat er dan minstens 16 ramen broed moeten zijn en een behoorlijk aantal haalbijen. Uitgaande van de wetenschap dat er ca. zes weken verlopen zijn voor een ei is uitgegroeid tot een haalbij, betekent dat voor mij dat ik begin maart de eerste ingreep probeer te doen.

De eerste ingreep bij voorkeur bij een temperatuur van 10°C of hoger:

- bovenbak openen, vulblokken er uit en vervangen door uitgebouwde ramen, voer openkrabben van de middelste twee ramen. Zit het broednest ongeveer centraal in de kast? Indien nodig dit corrigeren. Hierdoor wordt het broednest naar boven uitgebouwd. Als u niet voldoende voer in de kast hebt, dan kunt u ook een voerdeeg met pollenvervangers gebruiken.

De tweede ingreep een week tot tien dagen later wordt de kast opnieuw geopend en opgekrabde

voerramen tussen het broed in de bovenbak gehangen. Hiermee wordt om de 7-10 dagen doorgedaan, totdat er 16 ramen of meer broed zijn.

Bij de derde ingreep worden bij gunstig weer de vulblokken uit de onderste bak verwijderd. Deze kunnen mogelijk vervangen worden door voerramen uit de bovenbak, die dan weer worden vervangen door kunstraat. Bij het opzetten van de derde bak, kunt u eventueel kiezen om de koningin tussen roosters op te sluiten (methode Renson) in de middelste bak. Gaat u volgens Pfefferle door, dan moet u regelmatig controleren en steeds voor voldoende ruimte zorgen. Aarzel niet om een vierde bak te geven als de honingkamer al redelijk is gevuld. Als u deze methode wilt uitproberen en nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met: Jan Veldkamp, 046-4746535.

Bron: 'Infoflits' van Imkersvereniging Mijnstreek, LLTB

Hofman agrarische producten

Het adres voor: Zaden en Zaadmengsel voor uw bijenweide.

Bevat: Phacelia, boekweit, mosterd, bladramanas, borage, goudsbloem, nigella, korenbloem, dille, kaasjeskruid.



Voor meer informatie:

Grimbergerweg 11 7467 PR Notter
Tel: 0548 - 512979, Fax: 0548-540331