

Slingeren

In juni wordt voor de tweede en/of de derde keer geslingerd. De laatste jaren werk ik steeds met moerroosters. Ofschoon het een fikse barrière is in het volk, blijkt het in onze omgeving toch een handig middel om te voorkomen dat er broed in de honingkamers komt. Broed in de honingkamers is erg lastig. Niet alleen bij het slingeren, maar ook als de honing van het volk gehaald moet worden. Nu kan ik dat snel doen door een dag voor het slingeren het rooster te verwijderen en daarvoor een uitlaatbord in de plaats te leggen.

Uitlaatbord

Een uitlaatbord werkt fantastisch. Het voorkomt dat er bijen van de raten geslagen of geveegd moeten worden. Het werkt echter slecht of helemaal niet als er nog broed in de honingkamer zit. De bijen willen dat niet verlaten.

De bijen worden dankzij het uitlaatbord minimaal gestoord en de honingkamers kunnen lekker snel verwijderd worden. Dat is goed voor de jonge moeder en het voorkomt roverij. Het moerrooster zorgt ervoor dat de raten mooier blijven, daar ze niet bebroed worden. Dat is handiger bij het slingeren, want de bijen verzegelen de honingcellen met de was van de omliggende raten. Zijn die donker dan krijg je ook donkere zegels op de honing. Donkere raten (oude was) zijn lastiger te ontzegelen.

Controle nieuwe moeren

Eind mei of begin juni, afhankelijk van het jaar, vindt ook de controle van de jonge moeren plaats. Als de dekplank goed vast zit, kijk ik niet verder. Ook aan het vlieggat is al veel te zien. Flink stuifmeel verzamelen betekent broed. In een later stadium kan dat ook via de vallende varroamijten gecontroleerd worden. Als er weer meer mijten vallen en ook bleke mijten dan is er uitlopend broed in het volk. Bovendien liggen er dan ook wasdekseltjes van broedcellen op de bodem. De glazen dekplank bewijst ook hier weer haar dienst. Ik kan zonder te storen zien of er bouwactiviteiten zijn en dan zit het goed. Afblijven dus. Is de jonge moeder niet aan de leg, dan hang ik er een raampje met open broed uit een ander volk in. Zitten er de volgende dag geen redcellen op, dan is de zaak in orde.

Drieramertje

Als het volk moederloos blijkt te zijn (redcellen aangetrokken) dan biedt een reservevolkje op drie


ramen uitkomst. Daarom maak ik als het even kan een 3-raams reservevolkje tijdens het doppen breken. Heb ik het reservevolkje later niet nodig, dan geef ik het weg. Er is altijd wel een collega die er blij mee is. Zou ik dat niet doen dan stijgt het aantal volken en dat wil ik niet.

Moerloze volken moergoed maken

Moeren invoeren in hopeloos moederloze volken is vragen om problemen. Met het 3-ramertje lukt dat meestal wel. Ik handel daarbij als volgt. Het moederloze volk sla ik in een wasmand. Het 3-raamsvolkje wordt in een 10-raams kast gehangen. Die vul ik aan met lege raten uit het moederloze hoofdvolk. Deze kast komt op de plek van het moederloze volk te staan. De mand met bijen uit het moederloze hoofdvolk komt op een tiental meters voor de stand te staan, waarvandaan ze vanzelf terugvliegen. De nieuwe moeder zit veilig tussen haar eigen bijen, waardoor het volgens mij zo vaak goed gaat.

Op de grond stoten

Vroeger stootte ik het moederloze volk ook wel op de grond. Dat ging goed totdat er een volk was dat daar dagen bleef liggen. Met veel moeite heb ik ze weer teruggekregen door ze op een raat te laten kruipen. Als ze vanuit de mand niet terugvliegen kan ik de mand simpelweg 's avonds tegen de kast zetten. Na een paar minuten kruipen ze dan alsnog naar binnen zonder daar een puinhoop aan te richten en de nieuwe moeder te doden.



Honing in schone raten. Een lust voor het oog en een lust om te slingeren